



University of Al-Qadissiyah  
College of Nursing



**Research Title:**  
**Assessment Knowledge of Nursing Home Care Workers Towards  
Management of Patients With ADHD**

**Students:**

Walaa Ibrahim Ghadab, Asraa Ali-Abd Abd-Alhussain, Zainab Allawi Gaien, Hawraa Furat  
Abd-Alhussan, Ayaat Hussain Naji, Hanan Aziz Rumman, Haider Hatem Sultan, Dr. Haidar  
Ameer Jabor

**Supervised by:**

Dr. Haidar Ameer Jabor

**Abstract**

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most commonly diagnosed chronic childhood. ADHD is present in childhood and symptoms tend to decline with increasing age, with consistent reductions documented in hyperactive-impulsive symptoms but more mixed results regarding the decline in initiative symptoms. Estimation differ for a number of reasons, including different diagnostic criteria for ADHD, and different risk factors. The objectives of the study include assessment knowledge of home care workers toward management of child with ADHD and identify the relationship between of workers' knowledge and their demographic data. In Al-Diwaniya Teaching Hospital Psychiatric and care homes for people with special needs. Descriptive questionnaire-based study conducted at care homes for people with special needs from (November to January) on a non-probability (purposive) sample consisting of (20 persons) of caregivers of ADHD patients.

result: shows that there is high significant relationship between demographic data and level of knowledge at P. value (0.05) , so the result of this table reveals that a significant relationship between level of knowledge and their experiences and practices in this field toward management of cases with ADHD. At P. value 0.05 . And This results shows that there is found significant relationship between level of knowledge and number of training among staff care workers toward management of child with ADHD, While no significant differences between level of knowledge. Conclusion: this level of knowledge notched for home care workers who mean years of experience is 11 who have the mean of experience to deal with ADHD patients. And the mean of the age group of the health workers is 35.70 at p.value(0.05).

جامعة القادسية  
كلية التمريض

عنوان البحث:

## معرفة تقييم العاملين في الرعاية المنزلية في التمريض تجاه إدارة المرضى المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

الطلاب:

ولاء ابراهيم عذاب ، اسراء علي عبد الحسين ، زينب علاوي ، حوراء فرات عبد الحسن ،  
آية حسين ناجي ، حنان عزيز رمان ، حيدر حاتم سلطان

بإشراف:

د. حيدر أمير جبر

### المخلص

يُعد اضطراب فرط الحموضة ونقص الانتباه (ADHD) أحد أكثر حالات الطفولة المزمنة شيوعاً. يوجد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الطفولة وتميل الأعراض إلى الانخفاض مع تقدم العمر ، مع انخفاضات متسقة موثقة في أعراض فرط النشاط والانفعال ولكن نتائج مختلطة أكثر فيما يتعلق بانخفاض أعراض المبادرة. يختلف التقدير لعدد من الأسباب ، بما في ذلك معايير التشخيص المختلفة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وعوامل الخطر المختلفة. تشمل أهداف الدراسة تقييم المعرفة للعاملين في الرعاية المنزلية تجاه إدارة الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتحديد العلاقة بين معرفة العاملين وبياناتهم الديموغرافية. في مستشفى الديوانية التعليمي دور الطب النفسي ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. دراسة وصفية مبنية على الاستبيان أجريت في دور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من (نوفمبر إلى يناير) على عينة غير احتمالية (هادفة) تتكون من (٢٠ شخصاً) من مقدمي الرعاية لمرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

النتيجة: تظهر أن هناك علاقة معنوية عالية بين البيانات الديموغرافية ومستوى المعرفة عند القيمة P. حالات ADHD. بقيمة P. 0.05. وتبين هذه النتائج أن هناك علاقة معنوية بين مستوى المعرفة وعدد التدريب لدى العاملين في رعاية العاملين تجاه إدارة الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى المعرفة. الخلاصة: هذا المستوى من المعرفة الذي تم إجراؤه للعاملين في الرعاية المنزلية الذين يعينون سنوات من الخبرة هو ١١ الذين لديهم متوسط الخبرة للتعامل مع مرضى ADHD. ومتوسط الفئة العمرية للعاملين الصحيين ٣٥.٧٠ ص ، قيمة (٠.٠٥).